

Алгоритм антибактериальной терапии бактериального риносинусита

Острый риносинусит

Прием антибиотиков в предшествующие 3 месяца

НЕТ

ДА

Амоксициллин
1,5-2 г/с

Амоксициллин 3-4 г/с
Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 р/с или
1 г 2 р/с
Цефиксим 0,4 г/с
Цефдиторен 0,4 г/с

Аллергия на пенициллины в анамнезе

Кожные реакции

Анафилаксия или аллергия на цефалоспорины

Цефиксим 0,4 г/с
Цефдиторен 0,4 г/с

Джозамицин 2 г/с
Кларитромицин 1 г/с

Обострение хронического риносинусита

Прием антибиотиков в предшествующие 3 месяца

НЕТ

ДА

Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 р/с или
1 г 2 р/с
Цефиксим 0,4 г/с

Амоксициллин/клавуланат 2-3-4 г/с
Цефдиторен 0,4 г/с

Аллергия на пенициллины в анамнезе

Кожные реакции

Анафилаксия или аллергия на цефалоспорины

Цефиксим 0,4 г/с
Цефдиторен 0,4 г/с

Левифлоксацин 1 г/с
Моксифлоксацин 0,4 г/с