

# Алгоритм антибактериальной терапии пиелонефрита

Пиелонефрит  
неосложненный

Внутри в течение 7-10  
дней:

**Цефиксим** 0,4 г 1 р/с  
**Левифлоксацин<sup>2</sup>** 0,5 г  
1 р/с

При неэффективности:  
**Амоксициллин/клаву-  
ланат** внутри 625 мг 3 р/с  
– 14 дней

Пиелонефрит  
осложненный<sup>1</sup>

Внутри в течение 14  
дней:

**Цефиксим** 0,4 г 1 р/с  
**Левифлоксацин<sup>2</sup>** 0,5 г  
2 р/с

При неэффективности:  
госпитализация и  
назначение антибиотиков  
парентерально

Пиелонефрит у  
беременных

Внутри в течение 10-14  
дней:

**Цефиксим** 0,4 г 1 р/с  
В/в или в/м в течение  
10-14 дней:  
**Цефтриаксон** 2 г 1 р/с  
**Эртапенем** 1 г 1 р/с

При известной  
чувствительности  
возбудителя:  
**Амоксициллин/клаву-  
ланат** внутри 625 мг 3  
р/с – 14 дней

<sup>1</sup> Пиелонефрит в сочетании с аномалиями и/или обструкцией мочевыводящих путей, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом

<sup>2</sup> Не применять в регионах с высоким уровнем устойчивости *E.coli* (> 20%) к фторхинолонам